

2021/5/31

厚生労働科学研究費 難治性疾患等政策研究事業  
「難治性炎症性腸管障害に関する調査研究」(久松班)


# Summary of Surveillance Epidemiology of Coronavirus Under Research Exclusion (SECURE-IBD)

JAPAN IBD COVID-19 TASKFORCE MEMBER

松本主之 松岡克善 松浦 稔 大宮直木  
飯島英樹 平井郁仁 石原俊治 仲瀬裕志  
久松理一


Brenner EJ, Ungaro RC, Colombel JF, Kappelman MD.  
SECURE-IBD Database Public Data Update.  
[covidibd.org](https://covidibd.org). Accessed on May /31/2021.

## COVID19感染IBD患者登録数の推移




## 登録数上位8カ国

2021/05/25 現在  
Japan登録数: 53




- COVID-19感染IBD患者の登録数の増加が緩やかになっている。
- ロシアとオランダの登録数は増加傾向が続いているが、他のヨーロッパ諸国やアメリカの登録数の増加は緩やかになっている。


2021/05/31 現在  
J-COSMOS 登録数: 74




## 感染患者の年齢分布




## 入院患者年齢分布




## ICU (%)



## Ventilator (%)




## Death (%)




- 0-9歳は母数が少ないため評価が難しい。
- 高齢者の高い死亡率は現在も減少しておらず、60歳以上で高値となる。
- その一方で、高齢者の入院率は低下傾向である。

## 疾患別患者数





## 疾患別重症度の割合




- 入院率、ICU管理率、人工呼吸器管理率、死亡率に関して、その差は大きくないものの、クロhn病よりも潰瘍性大腸炎の方が高値が続いている。

## 治療別の患者数




- Anti-TNF without 6MP/AZA/MTX と Sulfasalazine/mesalamineの登録数は多く、BudesonideとJAK inhibitorの登録数が少ない傾向は変わらない。

## 治療別の入院率の推移




## 治療別の総数と入院率




- 入院率はsteroidsで高値、Anti TNF without 6MP/AZA/MTXとIL 12/23 inhibitorで低値である。
- Sulfasalazine/mesalamineの入院率は比較的高値であるが、併存薬の情報がないため単剤のリスクに関しては言及できない(2020/4/10のデータは保存なく未記載)。

## 治療別のICU管理率の推移





## 治療別の総数とICU管理率



- ICU管理率もsteroidsで高値、Anti TNF without 6MP/AZA/MTXやIL 12/23 inhibitorで低値である。
- Sulfasalazine/mesalamineのICU管理率は比較的高値であるが、併存薬の情報がないため単剤のリスクに関しては言及できない(2020/4/10のデータは保存なく未記載)。


## 治療別の人工呼吸器管理率の推移

## 治療別の総数と人工呼吸器管理率




- 人工呼吸器管理率はsteroidsで高値、Anti TNF without 6MP/AZA/MTXで低値である。
- Sulfasalazine/mesalamineの人工呼吸器管理率は比較的高値であるが、併存薬の情報がないため単剤のリスクに関しては言及できない(2020/4/10のデータは保存なく未記載)。

## 治療別の死亡率の推移



## 治療別の総数と死亡率



- 死率もsteroidsで高値、Anti TNF without 6MP/AZA/MTXで低値である。
- Budesonideの死率はOral/parenteral steroidsと比較すると低値であるが、他の治療よりは高値である。
- Sulfasalazine/mesalamineの死率は比較的高値であるが、併存薬の情報がないため単剤のリスクに関しては言及できない(2020/4/10のデータは保存なく未記載)。